

Encaminhamento para avaliação e indicação de imunobiológicos especiais

Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Clínicas Especiais (RIE). Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) / Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE) / Unidade de Saúde.



Identificação do paciente

- Nome completo: _____
- Data de nascimento: ____/____/____
- Nome da mãe: _____
- CPF e/ou cartão SUS: _____
- Endereço: _____
- Telefone para contato: _____



Informações clínicas

- Diagnóstico e CID-10: _____
- Histórico clínico resumido: _____
- Imunobiológico solicitado: _____



Vacinas indicadas: (ticar as recomendadas)^{1,2}

- ☐ **Bacilo de Calmette-Guérin (BCG)** – ao nascer, o mais precocemente possível, até menor de 5 anos (dose única) - avaliar risco/benefício
- ☐ **Hepatite B (HB)** – crianças: uma dose ao nascimento e seguir o esquema com a Penta; adultos: quatro doses (0, 1, 2 e 6 a 12 meses), com o dobro da dose
- ☐ **Inativada Poliomielite (VIP)** – crianças: três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos de idade
- ☐ **Penta (DTP + HiB + HB)** – três doses, aos 2, 4 e 6 meses, com um reforço aos 15 meses de idade
- ☐ **Pneumocócica 13-valente (VPC13)** – crianças: três doses, aos 2, 4 e 6 meses, com um reforço aos 12 meses de idade; ≥5 anos: dose única
- ☐ **Rotavírus (Rota)** – crianças: duas doses aos 2 e 4 meses de idade - avaliar risco/benefício
- ☐ **Meningocócica ACWY** – crianças: duas doses, aos 3 e 5 meses, com um reforço aos 15 meses de idade e demais reforços a cada 5 anos; adultos: duas doses com intervalo de 8 a 12 semanas, e reforço a cada 5 anos
- ☐ **Influenza (INF3)** – crianças <9 anos: duas doses com intervalo de 4 a 6 semanas, reaplicar anualmente; adultos: aplicar anualmente
- ☐ **Doença do coronavírus 2019 (Covid-19)** – a partir de 6 meses (três doses em esquema primário; para pessoas com esquema primário completo, duas doses)
- ☐ **Febre Amarela (FA)** – crianças: duas doses, aos 9 meses e aos 4 anos de idade; adultos: avaliar risco/benefício
- ☐ **Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)** – crianças: duas doses, aos 12 e 15 meses de idade; adultos: duas doses
- ☐ **Varicela (VZ)** – crianças <12 anos: duas doses a partir de 1 ano de idade, com intervalo de 3 meses; crianças >12 anos: duas doses, com intervalo de 4 semanas; adultos: duas doses, se suscetível - avaliar/risco/benefício
- ☐ **Hepatite A** – crianças: duas doses a partir de 1 ano de idade, com intervalo de 6 a 12 meses; adultos: se suscetível, duas doses com intervalo de 6 a 12 meses



- ☐ **Pneumocócica 23-valente (VPP23)** – crianças: duas doses a partir dos 2 anos de idade, com intervalo de 5 anos; adultos: duas doses com intervalo de 5 anos (verificar intervalo entre a VPP23 e a VPC13)
- ☐ **Vacina papilomavírus humano (HPV) quadrivalente** – crianças e adultos (9 a 45 anos): três doses (0, 2 e 6 meses)
- ☐ **Vacina *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib)** – crianças: em maiores de 12 meses nunca vacinados, aplicar duas doses, com intervalo de 2 meses; adultos: duas doses com intervalo de 8 a 12 semanas
- ☐ **Difteria e tétano (dT)** – crianças: a partir de 7 anos, três doses (0, 2, 4 meses); adultos: três doses (0, 2, 4 meses) e reforço a cada 10 anos
- ☐ **dTpa** – Gestantes: uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana

Justificativa para indicação do imunobiológico: _____

Anexos obrigatórios: ☒ Encaminhamento do Profissional de Saúde () Relatório clínico
() Laudo comprobatório (se aplicável)

Encaminhado por: () Médico () Enfermeiro () Outro profissional de saúde

Nome do profissional: _____

Nº do registro profissional (CRM / Coren / Outro): _____

Instituição de saúde: _____

Cidade / Estado: _____

Data do encaminhamento: ____/____/____

Assinatura e carimbo: _____

IMPORTANTE: COMO ACESSAR SUAS VACINAS NA RIE³⁻⁵

Você foi encaminhado para receber vacinas especiais dentro da Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Clínicas Especiais (RIE). Para garantir o acesso ao imunobiológico indicado, siga estas orientações.

Onde tomar a vacina?

- Se houver um Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) em sua cidade, dirija-se ao local indicado pelo profissional de saúde.
- Se houver um Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE) em sua cidade, você poderá ser atendido no CIIE conforme a organização da rede local.
- Se não houver Crie nem CIIE em sua cidade, vá até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para solicitar a vacina. A UBS encaminhará seu pedido ao Crie estadual ou ao CIIE mais próximo, e você será avisado quando a vacina estiver disponível.

Documentos necessários no dia da vacinação

- Documento de identidade (RG ou CPF).
- Cartão do SUS.
- Esse documento de encaminhamento preenchido e assinado pelo profissional de saúde.
- Relatório médico ou exames recentes (se aplicável), como contagem de CD4, carga viral ou outros laudos comprobatórios de sua condição de saúde.
- Carteira de vacinação (se disponível).

Dicas importantes

- Se precisar de ajuda para localizar o Crie ou o CIIE mais próximo, procure sua UBS ou acesse o *site* do Ministério da Saúde para mais informações.
- Em caso de dúvidas, leve esse documento a um profissional de saúde da UBS ou entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde de sua cidade.
- Mantenha sua vacinação em dia. As vacinas são essenciais para proteger sua saúde e fortalecer sua imunidade contra doenças preveníveis.

