


80% das hospitalizações ocorre em bebês e crianças pequenas saudáveis e nascidas a termo.^{6,b}



Prematuros têm risco 5,6X maior de hospitalização por VSR,^a mas todos os bebês estão sob risco.⁷

^aEstudo prospectivo de vigilância nos EUA em 7 hospitais pediátricos com crianças < 5 anos com doença respiratória aguda de 2016 a 2020.⁶

^bEm comparação aos bebês nascidos a termo.⁷

Saiba mais sobre o VSR e a sua prevenção em:



Referências: **1.** Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Vírus sincicial respiratório (VSR). 2025. Disponível em: <https://familia.sbim.org.br/doencas/virus-sincicial-respiratorio-vsr>. Acessado em 19 de agosto de 2026. **2.** Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About RSV. 2025. Disponível em: <https://www.cdc.gov/rsv/about/index.html>. Acessado em 19 de agosto de 2026. **3.** Mayo Clinic. Respiratory syncytial virus (RSV). 2023. Disponível em: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098>. Acessado em 19 de agosto de 2026. **4.** Esposito S, Abu Raya B, Baraldi E, et al. RSV Prevention in All Infants: Which Is the Most Preferable Strategy?. *Front Immunol.* 2022;13:880368. **5.** Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). Proteção desde o início. Disponível em: <https://protecaodesdeoinicio.com.br/>. Acessado em 19 de agosto de 2026. **6.** Curns AT, Rha B, Lively JY et al. Respiratory Syncytial Virus-Associated Hospitalizations Among Children <5 Years Old: 2016 to 2020. *Pediatrics.* 2024;153:e2023062574. **7.** Goldstein M, Krilov LR, Fergie J et al. Respiratory Syncytial Virus Hospitalizations among U.S. Preterm Infants Compared with Term Infants Before and After the 2014 American Academy of Pediatrics Guidance on Immunoprophylaxis: 2012-2016. *Am J Perinatol.* 2018;35(14):1433-1442. **8.** Griffiths C, Drews SJ, Marchant DJ. Respiratory Syncytial Virus: Infection, Detection, and New Options for Prevention and Treatment. *Clin Microbiol Rev.* 2017;30(1):277-319. **9.** Ministério da Saúde. Vírus Sincicial Respiratório. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/v/vsr>. Acessado em 19 de agosto de 2026. **10.** Centers for Disease Control and Prevention (CDC). RSV in Infants and Young Children. 2026. Disponível em: <https://www.cdc.gov/rsv/infants-young-children/index.html>. Acessado em 19 de agosto de 2026.

Este material informativo não substitui a conversa com um médico, pois apenas esse profissional poderá te orientar sobre a prevenção de doenças e o uso adequado de medicamentos. Não tome nenhum medicamento sem ter recebido orientação médica.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EUA, e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
BR-RSM-00041 PRODUZIDO EM AGOSTO/2026
VÁLIDO POR 2 ANOS.



Vírus Sincicial Respiratório

Uma infecção que pode ficar longe do seu bebê¹



Seu bebê pode estar em risco



O vírus sincicial respiratório (VSR) é uma das maiores causas de **infecções respiratórias em recém-nascidos e bebês**.¹



É um dos principais vírus associados à **bronquiolite e a pneumonia** em menores de 1 ano.^{1,2}




Apresenta sintomas semelhantes aos de um resfriado.¹



Nos primeiros meses de vida, com a resposta imune ainda em desenvolvimento, lactentes ficam mais vulneráveis ao VSR, que pode causar doença grave, hospitalização e, em alguns casos, óbito.^{3,4}



Quase dois terços das **hospitalizações por VSR** acontecem **até os 3 meses**.⁵



O VSR **infecta mais de 95% das crianças até os 2 anos de idade**.⁸



Transmissão



O VSR é transmitido pelas secreções do nariz ou da boca da pessoa infectada, por contato direto ou por gotículas.¹



Dois dias antes de aparecerem os sintomas, a pessoa contaminada já pode transmitir o vírus.¹



Não existe um tratamento específico para o VSR. Em casos graves, é imprescindível a hospitalização.¹



Por isso a prevenção é essencial^{9,10}



É importante lavar ou higienizar as mãos com frequência e evitar contato com pessoas infectadas.⁹



A vacinação da mãe durante a gravidez e a imunização de recém-nascidos e lactentes são estratégias de prevenção recomendadas.¹⁰

Consulte seu pediatra para saber mais sobre as formas de prevenção.



O vírus sincial respiratório (VSR) é uma das maiores causas de infecções respiratórias nos bebês nascidos a termo.¹

É um dos principais vírus responsáveis e transmitido via gotículas em contato com secreções de nariz.²

Aparece sintomas semelhantes aos da gripe.³

Em crianças saudáveis, não é considerada uma doença grave, mas em bebês nascidos com VSR, que podem ser prematuros, hospitalizações e, em alguns casos, óbito.⁴

Quase dois terços das hospitalizações por VSR ocorrem antes de 6 meses.⁵

80% das hospitalizações ocorrem em bebês e crianças pequenas nascidas a termo.^{6,7}

Em média, das 10 a 15 milhões de hospitalizações por VSR, mais de 1 milhão são em bebês nascidos a termo.⁸

1. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 2. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 3. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 4. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 5. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 6. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 7. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo. 8. Instituto de Medicina da Universidade de São Paulo.

Vírus Sincicial Respiratório

Uma infecção que pode fazer
longe da sua bebê?



Seu bebê pode
estar em risco



Ombucidade respiratória é uma das
maiores causas de infecções respiratórias
em recém-nascidos e bebês?



É comum que bebês com síndrome
de Down tenham uma maior chance de
terem uma infecção?



Apresentar sintomas semelhantes
aos de um resfriado?



Não prevenir a doença, com a
resposta imune ainda em desenvolvimento,
bebês ficam mais vulneráveis ao
VSR, podendo causar doença grave,
hospitalização e, em alguns casos, óbito?



Quase todos os bebês hospitalizados
por VSR correm um alto risco de óbito?



O VSR infecta mais de 95%
das crianças até os 2 anos de idade?



Transmissão



O VSR é transmitido pela troca de
saliva ou contato da pessoa infectada por
outro objeto ou por gotículas?



Indivíduos de aparência saudável,
e mesmo com sintomas, podem transmitir
o vírus?



Mesmo sem tratamento específico para
evitar sintomas graves, é importante
e hospitalização?



Por isso a prevenção é essencial?



É importante lavar as mãos
e evitar contato com bebês com
sintomas de infecção?



É importante evitar contato com
bebês com sintomas de infecção
respiratória ou com sintomas de
doença grave?